

# Medicamentos y suplementos que debe evitar antes de su procedimiento

Su equipo de atención le ha pedido que evite ciertos medicamentos, vitaminas, suplementos y hierbas como parte de su preparación para el procedimiento. Esto es para prevenir los problemas de sangrado.

Debe dejar de ingerir medicamentos y suplementos anticoagulantes, al menos, 1 semana antes del procedimiento. Podrá empezar a ingerirlos nuevamente 48 horas después del procedimiento. **No deje de ingerir medicamentos anticoagulantes recetados sin antes consultar con su médico.**

Esta es la lista de medicamentos y suplementos que debe evitar. Otros medicamentos y suplementos también podrían causar problemas de sangrado. Asegúrese de revisar con su médico todos los medicamentos y suplementos que ingiera.

---

## Medicamentos

---

Advil® - ibuprofeno

Aggrenox® - aspirina/dipiridamol

Aleve® - naproxeno sódico

Productos Alka-Seltzer®

Anacin® - aspirina/cafeína

Arixtra® - fondaparinux

Asacol® - mesalamina

Aspirina

Brilinta® - ticagrelor

Celebrex® - celecoxib

Coumadin® - warfarina sódica

Effient® - prasugrel

Eliquis® - apixabán

Excedrin® - paracetamol/aspirina/cafeína

Fiorinal® - butalbital/aspirina/cafeína

Fragmin® - dalteparina

Heparina

Ibuprofeno

Indocin® - indometacina

Lovenox® - enoxaparina

Productos Midol®

Mobic® - meloxicam

Motrin® - ibuprofeno Nuprin® - ibuprofen

Nuprin® - ibuprofeno

Persantine® - dipiridamol

Plavix® - clopidogrel

Pletal® - cilostazol

Pradaxa® - dabigatrán etexilato

Ticlid® - ticlopidina

Productos Triaminic®

Xarelto® - rivaroxabán

---

### Vitaminas, suplementos y hierbas

---

Comprimidos de pimienta de cayena

Comprimidos de canela

Curcumina (cúrcuma)

Equinácea

Aceite/comprimidos de onagra

Aceite de pescado/ácidos grasos omega-3/DHA (Lovaza®)

Aceite de lino

Comprimidos de ajo

Ginkgo biloba

Ginseng

Glucosamina

Comprimidos de té verde

Té de hierbas

Multivitamínicos

Resveratrol

Hierba de San Juan

Vitamina A

Vitamina E

Vitamina C

Puede ingerir acetaminofeno (Tylenol® o Tylenol Extra Strength®) hasta el día previo al procedimiento para aliviar dolores y molestias menores. Puede utilizar árnica para aliviar dolores leves antes y después del procedimiento.

**Si tiene preguntas, llame a nuestro consultorio al 847.854.3522 (TTY: 711).**